



د بوی مادران د کروندو کلتوری ارزښت

پوهاند گل احمد ظاهریان

دپارتمنت هارټکلچر، پوهنځی زراعت، پوهنتون کابل، کابل، افغانستان

ایمیل: Gulahmad_Zahiryar@Yahoo.com

لنډیز

بوی مادران (*Achillea millefolium*) څوکلن بوټی او د (Asteraceae) په کورنی پوری اړه لری. بوی مادران په طبیعی درملنی کی د پخوا څخه استعمالیده، اکثراً د ټپونو د وینو پر بندولو باندی اغیزی لری. د بوی مادران گلان، پانی او ته په پخلنځیو او درملنو کی استعمالیری. د بوټی پانی د اومه او پخه په ډول استعمالیری. بوی مادران لمرلرونکی سیمی او سپکو ریگی خاوری ته ترجیح ورکوی. دا بوټی په وچو، منځنیو، ښه زهکنی شوی ریگی لوم خاوری چی بشپړه لمر ولری ښه وده کوی. دا بوټی د باغونو د کمزورو خاورو سره چی زهکنی شوی وی مقاومت لری. دا بوټی د دوی د تودوخی، لنډبل او وچو اقلیم سره مقاومت لری. د بوی مادران بوټی د سپرکونو پر خنډی، کروندو، خرابو ځمکو، شیلو، هموارو چمندونو وده کوی. د گل سر (وری)، لوی، کلک د تنی پر سر موقعیت لری او هر کلستر د یوه او یا د ډیری گلان د سرونو څخه جوړ شوی دی.

کلیدی اصطلاحات: بوی مادران؛ عنعنوی؛ طبی؛ گل؛ پانی؛ پخلنځی؛ وچ اقلیم

Yarrow Cultivate Culture Value

Prof. Gul Ahmad Zahiryar

Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Kabul University, Kabul, Afghanistan

Email: Gulahmad_Zahiryar@Yahoo.com

Abstract

Yarrow (*Achillea millefolium*) is a perennial plant from the Asteraceae family. Yarrow has seen historical use as in traditional medicine, often because of its astringent effects. Yarrow uses in cooking and medicinal include the following, flowers, leaves and stems. Leaves can be consumed raw or cooked. Common yarrow prefers sunny locations on thin, sandy soils. Best grown has in lean, dry to medium, well-drained sandy loams in full sun. Plants do well in average garden soils and tolerate poor soils as long as drainage is good. Plants also tolerate hot, humid summers and drought. You'll see yarrow along roadsides, in fields, waste areas, canyon bottoms, grasslands and open forests and even on lawns. Flower heads are arranged in large, compact clusters at the top of the stem. Each cluster consists of 1 or more flower heads.

Keyword: Yarrow; Traditional; Medicine; Flowers; Leaves; Cooking; Drought

سریزه

د بوی مادران (Yarrow) د بوټی علمی نوم *Achillea millefolium* او د Asteraceae په کورنی پوری اړه لری. بوی مادران او یا زر پانی، وابسه ای څوکلن بوټی دی، چی تنه او بناخونه ئی راسته وده لری. د بوټی لوړوالی د ۳۰ څخه تر ۹۰ سانتی مترو پوری رسیری. دا په حوزه مدیترانه او منځنی اسیا کی وده لری. دا بوټی په دودیز ډول به درملنی کی استعمالیری. دا بوټی زرغون ژیر ته ورته رنگ او د پانی لیکي ئی اوږده، گلان ئی اوږده گیډی، د وری په ډول د پانو په څنگ کی لری. دانی ئی صاف او کروی دی. د دی بناخونه څانگړی بوی لری. په دودیز درملنی کی د ټټر د صافولو لپاره مصرفیری او د ساه د بندیدو د مخنیوی په نامه یادیری. په نوی زلاند او استرلیا کی د څاروی د خوراک لپاره استفاده کیږی. دا معمولاً د لندو او وچو سیمو لکه د سرکونو څنډی، د څرخایونه، کروندی او ساحلی سیمی بوټی دی (۴). دا بوټی د تندی په مقابل کی کلک دی او د خاورو د تخریب څخه مخنیوی کوی. دا بوټی د څاروی د خوراک لپاره استفاده کیږی. د دی بوټی د شتون یو دلیل د رینسو ژوروالی دی، چی په گډ ډول د نورو وابسو سره وده کوی، د دی بوټی پانی د منرال څخه بډای دی. په څارویو کی د دی بوټی د خوړلو په اساس د منرالونو لروالی له منځه وړی. د بوی مادران ډولونه به دودیز ډول استعمالیزی او اصلاح شوی بوټی د ښه کیفیت لرونکی ډولونو پواسط تبدیلیږی (۶). دا بوټی د تندی سره کلک دی په چمندونو کی د نورو بوټیو سره وده کوی (۲). دا بوټی گرم او وچ څانگړتیاوی لری.

د بوی مادران بوټی د سمندر د سطحی څخه ۳۵۰۰ متره لوړتره وده کولای شی. دا بوټی به هر ډول خاورو کی لکه خرابو خاورو، د څرخایونه او څنگلونو کی وده کوی، فعاله وده د پسرلی په موسم کی تر سره کوی او معمولاً د غوئی څخه تر غبرگولی میاشتوگلان تولیدوی (۱۰). د بوی مادران د بوټی اصلی ټاټوبی اروپا او اسیا دی مگر د انگلستان څخه تر چین پوری پیدا کیږی.



تاریخ

بوی مادران د کروندو اضافی وابسه دی چی پر خپل سر به دښتونو، د سرکونو پرڅنډی، غرنی سیمو کی شنه کیږی. د بوی مادران د بوټی اصلی ټاټوبی د آسیا، اروپا او شمالی امریکا معتدله سیمی دی چی تر ۵۰۰۲ مترو ارتفاع د سمندر څخه لری وده کوی. د بوی مادران بوټی لاتینی نوم اشیل (*Achillea*) دی، چی د یونان د افسانوی قهرمان نوم دی. د تروا د جنگو (۱۲۰۰ کاله مخ له میلاد څخه) په دوره کی د بوی مادران څخه د ټپونو د درملنی، د وینو د دریدلو او التهاب لپاره استفاده کیده. دی بوټی څخه د ساکسون (*saxon*) په دوره کی د نظر د ورکولو او د سحر او جادو لپاره استفاده کیده. د دودیز نوم (د پژی وینه) کاراوه چی په دودیز د وینو بندیدل تشریح کوی. دا بوټی تر ۳۵۰۰ متر د سمندر د سطح څخه اوچت وده کولای شی (۱۰). ډیر خلک چی د بوی مادران بزغلی لری دا د زینتی بوټی په توگه کری. دا بوټی په باغونو، زینتی ځایونو په توپیر لرونکی اقلیمو کی شنه او وده کوی، دا په شمول د اصلی ټاټوبی، د تندی سره کلک او به خپل سر په باغونو کی شنه کیږی.

د بوی مادران نمونه

د بوی مادران بوټی په انگلیسی ورته *yarrow*، او نور دودیز نمونه لکه *ordaldo*, *nosebleed*, *old man's*، *bloodwort pepper*, *devil's nettle*, *sanguinary*, *milfoil*, *soldier's woundwort*, *thousand-leaf* (۲). په هسپانوی، مکسیکوئی د پانیو په اساس ورته پلوماجیلو (*plumajillo*) او یا کوچینی پلار *little feather* وائی، په جرمنی کی ورته گرو (*gerw*) وائی. د دی بوټی علمی نوم (*Achillea*) د زر پانی په معنا دی، چی د بوی مادران د پانیو ډک څانگو ته اشاره شوی. یونانیان په ټولو جنگونو کی د درملنی په توگه د دی بوټی څخه گټه پورته کول. د ځینو معتبرو اثارو په اساس دا بوټی د اشیل (*Achillea*) په نامه پیژندل شوی چی د یونان لوی قهرمان اشیل نومیده د خپلو سربازانو د ټپونو د درملنی لپاره په جنگونو کی استعمالول. د انگلستان د کلو خلک دا بوټی د عسکر د ټپ ټپولو او بخار وابسه په نامه پیژنی چی ټپونه جوړوی، د دی بوټی بل نوم د پوزی وینه دی، چی دلیل ئی د پوزی د وینو بندیدل دی. د کلو خلک د بوی مادران تازه پانی د پوزی په سوری کی داخلول او وینه ئی درول. په کوردی ژبه د بوژانه (*bozhana*) په نوم یادوی، چی معنائی (درد لپاره) دی، ځکه دا بوټی د تسکین او د درد ضد خواص لری. د دی یو ډول بوټی چی په ټیتو سیمو کی شتون او لږ بوی لری د (*brnjdas*) په نامه یادیری. او بل ډول چی په لوړو ارتفاعاتو کی وده کوی، تند تره او د عطری بوی لری د (*bozhana*) په نامه یادیری. د بوی مادران بوټی د پخوا زمانو څخه د درملنی د خواص په اساس د لوړ شهرت او اعتبار خاوند دی او حتی د ناندرتال په دوره کی د انسانانو په قبرونو کی د دی بوټی گرده لیدل شوی دی.



انخور ۲: د بوی مادران د بوټی ډولونه او تخم (<http://juha.blogfa.com>)

د بوی مادران ډولونه (varieties and subspecies) لکه: *Achillea millefolium* subsp. *millefolium*

- *Achillea millefolium* . subsp. m. var. *millefolium* – Europe, Asia
- *Achillea millefolium* subsp. m. var. *borealis* – Arctic regions
- *Achillea millefolium* . subsp. m. var. *rubra* – Southern Appalachians
- *Achillea millefolium* subsp. *chitralensis* – western Himalaya
- *Achillea millefolium* subsp. *sudetica* – Alps, Carpathians
- *Achillea millefolium* var. *alpicola* – Western United States, Alaska (<https://en.wikipedia.org>)
- *Achillea millefolium* var. *californica* – California, Pacific Northwest (<http://www.agri-es.ir>)
- *Achillea millefolium* var. *occidentalis* – North America (<https://www.google.com>)
- *Achillea millefolium* var. *pacifica* – west coast of North America, Alaska (<https://www.webmd.com>)
- *Achillea millefolium* var. *puberula* – endemic to California^(۱۱)

د بوټی خانگ رټیاوی

د دی بوټی علمی نوم *Achillea millefolium* او د Asteraceae په کورنی پوری اړه لری. بوی مادران راسته وده لرونکی، وابنه ای، خوکلن، د اوږده ورځو، لمر خوبونونکی او دوه مشیمه‌ای بوټی دی. د (*Achillea millefolium*) بوټی د بوی مادران په نامه یادیری. معمولی بوی مادران د اروپا، اسیا چی اصلی ټاټوبی بلل کیږی امریکا ته د مهاجرینو پواسطه وړل شوی دی.

دا بوټی د منځنی او سهیلی اروپا، ختیځ اسیا او شمالی افریقا په لنډبلو ځمکو کی وده کوی. په شمالی امریکا کی د بوی مادران اصلی او معرفی شوی جینوټایپونه $2N$ (diploid) او N (polyploid) بوټی شتون لری (۳). طبیعی بوی مادران معمولاً دوه ډوله سپین او ژېړ رنگونه لری. د بوټی ټول برخی تریخ ډوله خوند، نفوذ کوونکی بوی لری. د بوی مادران د (*millefolium*) ډول سپین رنگه گلان لری،

ولی د (santolina) ډول د اندازی په اساس وړوکی بوټی، د ژبر رنگه گلانو په درلودلو عطر لرونکی نفوذی بوی لری. دا بوټی بوټه ای دی او د ۱۰-۳۵ سانتي متر لوړوالی لری. د بوی مادران د دی سپیشز *Achillea filipendulina* اصلی ټاټوبی افغانستان او ایران شمیرل کیږی معمولاً د صاف گلابی چی روبناب سور رنگ لری، پانی ئی سرخس ته ورته دی شتون لری.

پانی

د بوی مادران پانی ژور پری دی، سرخس ته ورته پانی، بنه بوی لرونکی، او منحنی زرغون رنگ لری. نیزه ای ډوله، لږ څه اوږده او ۲-۳ واره غوخ شوی دی. پانی پت لرونکی خټه شین رنگ، اوږده لکی لری. د بوی مادران پانی بنه بوی لرونکی مصاله جوړوی. د دی بوټی مصاله په تجارتي ډول ډیر لږ لیدل کیږی. د دی کلتوار او دورگه بوی مادران ډیر قوی تنی، بنه توافق او لوی گلان تولیدوی، د دی گلان په زینتی باغونو کی ډیر شهت لری. د دی کلتوارونو د گلانو د رنگ اندازه په شمول د گلابی، سور، کریمی، ژبر او د گلپانی دوه رنگه تغیر خوړونکی دی.

پانی د تنی په اوږدوالی خپاره شوی دی، هغه پانی چی د تنی د ټیټی خواته شتون لری غټ دی او مخ ئی ډیر اوښتیان لری. د دی پانی اوږدوالی ۵-۲۰ سانتي مترو ته رسیږی، د پانی د لکی دواړو خواته دوی او یا دری کوچنی پانی لری، تقریباً د ماریچ په ډول د تنی پر شا وخو باندی موقعیت لری (۵).

د دی بوټی پانی لکه د چرگانو بوټی مایم او سپک دی، د ټپونو د وینو د دریدلو لپاره بنه مرحم بلل کیږی. د دی بوټی پانی باید په دوی کی ټول شی. دا بوټی په بشپړه ډول عطر لرونکی دی.

تنه

د ریښو د پاسنی برخی څخه ډیر استوانی ډوله تنی وده کوی. د بوټی جگوالی د سیمی په اقلیمی شرایطو پوری اړه لری، ۳۰-۱۰ سانتي مترو ته رسیږی. د بوی مادران نور ډولونه د سیمی د ودی په اساس توپیر لری چی لوړوالی ئی د ۱۰-۸۰، ۱۵-۵۵ او ۱۵-۴۰ او حتی د ۳۰-۹۰ سانتي مترو شاوخوا ته رسیږی (۴).

که چیری دا بوټی د ښکلا لپاره وکرل شی بنه به داوی چی د قوی بادونو څخه وساتل شی. د بوټی تنه په پسرلی کی مخ له گل کولو غوخ شی تر څو د بوټی جگوالی کنترل شی. د بوټی غوڅول تر څو د گلانو جانبی زخی وروسته د گل د تولیدیدو څخه اضافی گلان منځ ته راشی. د بوټی پانی وروسته له گل کولو غوخ شی. بوټی د رایزوم او خپل د تخم پواسطه هری خواته خپاره کیږی او یوه ټولنه جوړوی.

گل

د بوی مادران د بوټی ډولونه، منځنی زرغون، عطری، ښه بوی لرونکی پانی او ډیر ښاخونه تولیدوی، سپین گلان ډیر پیوست (متراکم) تولیدوی. دا بوټی به چمنونو، طبیعی باغونو، دښتونو او شهری سیمو کی شنه کیږی چی ځینی تازه او یا وچ گلان تر لاسه کیږی. دا ډول بوټی معمولاً په پراخه پیمانه پرخطونو باندی د پام وړ دی. د دی بوټی گلان د ځمکی او یا لمر لرونکی چمنونه، پرته د لاری څخه د بوښلو لپاره استعمال شی (۲).

د بوی مادران بوټی ډیر ښکلې چتری لرونکی گلان لری او بوټه ای ډول دی. د بوی مادران گل ۹-۴ راسته گردی گلان چی هر یو د سپین تر گلابی رنگ تولیدوی. معمولاً هر یو د ۳-۸ بیضوی ډوله څخه تر گردی گلان لری. د بوی مادران د وچو او تازه تناسب ۴:۱ دی، دگلانو وچ او تازه تناسب ۶:۱ دی. د بوټو ساتل په ځمکی کی د ۳-۵ کالو لپاره اقتصادی بلل کیږی. میوه ای، اوږده د چرگی دهگی په ډول، زرغون رنگه لری.

د بوی مادران د بوټی گلان سپین، ژیر، سور، گلابی، کریمی، نارنجی او داسی نور رنگونه لری او کله د ملایم صورتی په رنگ لیدل کیږی. د دی گلانو بوی مشک ته ورته دی، د دوپی د لمړی څخه د منی تر اخره دوام کوی.

یوه گردی گل د ۱۵-۴۰ کوچنی ښاخونه لری. گلانوکی، سپین، ژیر او یا صورتی رنگونو پرته له کاسبرگ څخه لری. منځنی رهبری گلوکی چی ۴-۸ ملی متر اوږدوالی او ۲-۵ ملی متر پسون لری او په دوه ډوله د ژبی په ډول سپین او ارغوانی رنگونو د گلازین پر څنډی چی د ۵-۶ څخه نه اوچتیږی، او بل لولی ای په ډول په منځ کی لیدل کیږی. گلان د اصلی او فرعی تنی په پاسنی برخه کی د تراکم چتری په ډول جوړ شوی دی. لمړی گلان د پسرلی په اخر کی منځ ته راځی او تر منی دوام کوی. د گلانو د وری پاسنی برخه ئی هموار دی او ډیر مچی او پروانی ځینی لیدنه کوی او گرده افشانی تر سره کیږی. لڅ کوچنی تخم یعنی میوه د کپسول په نامه یادیږی. د گلانو حاصل ټولول، چی په دی وقت کی گلان د لکی سره د ۳-۴ سانتی مترو په اوږدوالی غوڅ شی. گلان په دوم کال کی په هر هکتار کی د ۱-۴ ټنو په شاوخوا تر لاسه کیږی.

نیلی

د دی بوټی نیلی د تندی سره کلک دی. دا بوټی تر ځمکی لانندی څوکلن تنه ډوله ریښی، پراختیا موندلی دی. دا بوټی کلک مستقیم او ډیر نازکی پاشان نیلی لری یعنی پاشان ریښی هم خپاره شوی دی.

خاوره

د بوی مادران بوتی په کمزورو خاورو په توپیر لرونکو خاورو او اقلیمو کی وده کوی لکه د سرکونو پرځنډو، غرنی سیمی، میلان لرونکی، د کرنی کروندی، بی کرنی ځمکو، چمندونو، وچو سیمو، د خرځایونه او سرخلاصی ځنگلونو کی خپاره او پر خپل سرشنه کیږی. دا بوتی په پسرلی کی فعاله وده او د دویی د لندبل سره کلک دی.

دا بوتی ریگی او سپکی خاوری د پی اچ (pH=۶-۶/۷) په درلودلو ښه خوښوی. بوی مادران زهکښی شوی خاوری، بشپړه لمر لرونکی ته ترجیح ورکوی، اما د خپل د خوښی ودی لپاره لږ تر لږه ښه شرایط تر لاسه کولای شی (۷).

که چیری په ځمکی کی کرل کیږی، لمړی ځمکه ۲۰-۲۵ سانتي مترو په ژوروالی ښه یوی شی، ځینی وانبښه، ډیری لیری شی. په ځمکه کی ۳۰ ټنه حیوانی سره، د نایتروجن، فاسفورس او پتاشیم عناصر اضافه شی. دا عناصر پر ودی او گټمن موادو (موثره مواد) باندی گټور اغیزی لری. د ۵۰-۸۰ کیلو گرام هر یو فاسفورس او پتاشیم داره سره په هر هکتار ځمکه کی، د منی د کرلو په وقت کی ورکړه شی او ۴۰-۶۰ کیلو گرامه نایتروجن داره سره په هر هکتار ځمکه کی په دری پړاو کی استعمال شی.

دا بوتی د منځنی وده لرونکی په درلودلو د هر ډول خاورو، اقلیمونو او آب او هوا سره د توافق په اساس یو زینتی بوتی په باغچو او باغونو کی کارول کیږی. که چیری بوتی په غیر مستقیم ډول وکرل شی، په منی کی اصلی پتی ته انتقالیری او یوه کال وروسته له کرلو څخه گل تولیدوی او کولای شی چی حاصل واخلي. که چیری بوتی په مستقیم ډول په ځمکی کی وکرل شی حاصل په دریم کال کی ترلاسه کیږی.

اقلیم

د بوی مادران د ودی او گل کولو لپاره ښه تودوخه د سانتیگراد ۱۸-۲۶ درجه اټکل شوی دی. په گرمو او لمر لرونکو سیمو کی ښه وده کوی، په هغه سیمو کی چی کلنی اورښت ئی ۱۲۰ ملی مترو ی هم لیدل کیږی. بوی مادران د خپل د ودی په دوران کی ځانگری اقلیم ته اړه لری او تقریباً په هر اقلیم کی وده کوی اما په گرمو او لمر لرونکو سیمو کی ډیر گلان تولیدوی (۱۰).

بزغلی

د بزغلی د خاورو سره پنځم برخه ریگ گلی شی. دا په هغه ځای کی چی ښه لمر ولری وکرل شی. د دی بوتی تخم په پسرلی کی وکرل شی. د دی کار لپاره ښه موسم د پسرلی لمړی او منی دی (۵). بوی مادران د تخم د کرلو لپاره مناسب بستر باید د نورو وانبښو څخه پاک او ۱۵ سانتي متر ژوروالی ولری. بوی مادران د تخم پواسطه تکثیر کیږی او د ټوکیدنی لپاره لمر ته اړه لری، په بزغلی کی د قطارونو

ترمنخ ۵-۲۰ سانتی متر واتن به نظر کی و نیول شی. د بنه ټوکیدنی لپاره تخم باید تر ۶ ملی مترو ژور و نکړل شی، تخم په بزغلی کی نباید تر نیم سانتی متر ژوروالی ولری. تخم د ټوکیدنی لپاره د سانتی گراد ۱۸-۲۴ درجی تودوخی ته اړتیا لری.

تخم د ۷-۱۰ ورځی په موده ټوکیدنه کوی. په هر هکتار ځمکه کی ۲-۳ کیلو گرامه تخم ته اړه لری. د بوتی لمړی وده ضعیف دی. دا بوتی د ټوکیدنی لپاره باید بنه اوبونه تر سره شی. د دی تکثیر د ریښو سره تر سره کیږی. د بوی مادران د ژوند دوره په ځینی سیمو کی لند او په ځینو سیمو کی اوږد دی (۹).

په ځمکی کی کرل

د بوی مادران بوتی وروسته له کرلو څخه په چټکی سره وده کوی، کولای شی چی په دوپی کی پانی او د بوتی نوری برخی ټول شی، کله چی گلان تولید شی گلان ټول شی. تخم په مستقیم ډول په ځمکی کی د قطارونو تر منخ ۴۰-۵۰ سانتی متر او د بوتیو تر منخ ۲۵-۳۰ سانتی متر واتن په نظر کی و نیول شی. په پتی کی د تخم د مستقیم کرلو بنه وقت د دوپی د اخر څخه د منی تر لمړیو وقتونو پوری دی. د تخم مصرف په هر هکتار ځمکه کی د ۴-۶ کیلو گرامه دی. د بوی مادران بوتی ۴-۵ کلنو لپاره په ځمکی کی پاته کیږی. د ۴-۵ کلنو بوتی د تکثیر لپاره به منی کی د ځمکی څخه لیری شی او هر بوتی په ۲-۴ بوتی بانندی سره بیل شی او په تعین شوی پتی کی وکرل شی. د هغه بوتیو چی د ودیز دوره ئی لند وی، د بوی مادران سره په تناوب کی وکرل شی، ځکه وروسته له ټولولو څخه د ځمکی د جوړولو لپاره بشپړه وقت شته.



انځور ۳: د بوی مادران گلان (<http://juha.blogfa.com>)

اوبونه

بوی مادران د تندی سره کلک دی ولی د تندی په حالت کی پانی او نور اجزاوی لږیری. اوبونه په اقلیم پوری اړه لری، بیا هم د ۵-۱۰ وروځو به موده تر سره شی.

حاصل ټولول

بوټی د گل په وقت کی زیادترینه گټمن مواد لری، دا مرحله د بوی مادران د گلانو او نور غړو(تنه او ځوان بڼاخونه) د ټولولو بڼه وقت بلل کیږی. د بوی مادران پانې، تنه او گلان د گل په وقت کی ټول شوی. گلان د لکی سره د ۳-۴ سانتي مترو په اوږدوالی ټول شوی. د بوی مادران ټول شوی برخی په سیوری او یا د وچولو په ماشینونو کی د سانتیگراد د ۳۰-۴۰ درجو کی وچ شوی. د وچولو په وقت کی بی پروای، د بوی مادران د گلانو رنگ تغیر خوری او د گټمن په موادو کی لږوالی راځی.

د بوی مادران حاصل په دوم کال کی د هر هکتار ځمکه څخه ۱-۴ ټنه تر لاسه کیږی. د تازه او وچ بوټو تناسب ۱:۴ دی او د گلانو د تازه او وچ تناسب ۱:۶ دی. د عطر اندازه ۳-۵ کیلو گرامه د هر هکتار ځمکی څخه د تقطیر او بخار پواسط تر لاسه کیږی. د بوی مادران د بوټی څخه د کپسول، عصاره، پودر، چای، رنگ، محلول، درمل په ډول تر لاسه کیږی. د معمولی بوی مادران کلنی منځنی حاصل ۸۴۰۰۰ بوټی په یوه هکتار کی اټکل شوی او ۱۰۵۰۰ کیلو گرامه حاصل تر لاسه کیږی (۲).

د بوی مادران بوټی وروسته له ټولولو څخه په توپیر لرونکی ډول لکه: تازه بوټی او گلان، وچ بوټی، د کپسول په ډول، د گولی په ډول، د رنگ په ډول، د مایع په ډول او د چای په ډول مارکیټ ته وړاندی کیږی. نو تاسی کولای شی چی د بومادران تازه بوټی په طبیعی ډول خپل کور ته نږدی د ځمکو څخه تر لاسه کړی.



انځور ۴: د بوی مادران د بوټی ټولونه (https://draxe.com)

کیمیایو ترکیب

ضروری غوړ د پروزیولینز (proazulenes) په نامه یادیزی (۸). د ضروری غوړ تور ابی ډوله رنگ لرونکی د غوماشو (Aedes albopictus) لاروی وژنی (۱). د کامازولین (Chamazulene) او کادینول (δ-Cadinol) ترکیب د بوی مادران (A. millefolium) په بوټی کی پیدا کیږی. په ۲۰۱۳ عیسوی کال کی د یوه څیړنی په اساس معلوم شول چی د تجارتي بوی مادران ډیر غوړ، اشیاغ شوی

شحمی تیزابونه، پروتین، باارزبنسته انرجی، قند او فلاونوید (flavonoids) لری. طبیعی بوی مادران لوړ اندازه کاربوهایدرید، اورگانیک تیزابونه (organic acids)، غیر اشباع شوی شحمی تیزابونه (unsaturated fatty acids)، توکوپیرول (tocopherols) او فینولیک تیزابونه (phenolic acids) او داسی نور لری. بر سیره پر دی اسپاراجین (asparagine)، سالیسیلیک تیزابونه (salicylic acid) او فلاونوئید (flavonoids)، کروتنید (carotenoids)، ترپینز (terpenes) لری. د بوی مادران د گلاتو څخه غوړ عطر په ابی رنگ ترلاسه کیږی. په هر ۱۰۰ گرامو گلاتو کی ۱۰۰-۱۲۰ میلی گرامه ازولین تر لاسه کیږی، چی د یوه هکتار ځمکی څخه ۳-۵ کیلو گرامه لاس ته راځی. دا بوټی اینولین او لبر تانین لری چی په اروپا کی د تبی وړونکی په نامه استفاده کیږی چی فلاونوئید د اکسیدان، سرطان او التهاب ضد خواص لری، د بدن مقاومت جگړی او د ځگر ساتندوی دی (۴).

په خوراکی ټوکو کی د بوی مادران استفاده

د بوی مادران پانی اومه او پخه شوی په ډول مصرفیږی، او ځینی ترخه خوند لری. د بوی مادران ښه استفاده د بوټی په ځوانی پړاو کی دی. دا بوټی د خوراکی ارزښت په لحاظ ډیر بډای او خوندور بلل کیږی، نباید ډیر مصرف شی. د دی بوټی تند او تریخ پانی، ښاخونه او گلان د سلاد بوی او خوند ډیروی. د بوی مادران پانی د سبو په اکثریت پخلیو، سوپ او ساس او یا ایشولو او لبر ایشولو د کوچ سره استفاده کیږی. د دی پانی په نورو خوراکو کی د مصالی په ټوگه، د سرکه او غوړ لپاره استعمالیږی. ځوان تازه گلان په سلاد کی استعمالیږی. بوی مادران خوړ خوند لری او ځینی وقتونه ترخ وی. د دی پانی ډیر نرم دی که چیری د نورو سبو سره ډیر تودوخه ورگډه شی خوند ئی له منځه ځی. د بوی مادران د بوټی پانی په ۱۷ پیږی کی لکه پالک د سابه په ډول مصرفیده (۴). د بوی مادران بوټی چی د منځنی ودی عمر ولری د بیر د ښه خوند لپاره استعمالیږی (۲). د دی بوټی گلان او پانی په چښونکو (نشاب) او د ترخه خوړلو د خوند د تغیر لپاره استعمالیږی (۸).

د درملنی خواص

د بوی مادران بوټی د انسانانو د ساتنی لپاره غوره بلل کیږی چی د خولی له لاری د خوراکو سره وخورل شی. د بومادران د پانو، گلاتو او غوړ څخه گټه اخستل کیږی. د بوی مادران د گل څخه په درملنی کی د ساه د سیستم ستونځی ورکوی، د حساسیت ضد، خلط راوړل، التهاب ضد، اسپاسم ضد، د پوست ملایمول، د درد ورکول، هضم ښه کول، د کولمو د باد ضد، اشتیا ډیرو، د بواسیر ورکول، د امتیازی د ستونځی ورکول، د زړه د ستونځی لږول، د وینو فشار لږول، د تبی ورکول، د ویروس ضد، د بکتیریا ضد، د چنچی ضد، د غوماشی او حشراتو وژل، د یخ وهنی ضد، د زکام جوړول او پښتورگی درملنه په غاړه لری. د بوی مادران غوړ په ښځینه کی د میاشتنی عادت ښه کول،

د عضلاتو د پرسوب ضد لپاره کارول کیږي. د بوی مادران مرحم د ټټر او د سر د درد لپاره غوره دی. په شمالی امریکا کی په دودیز ډول د غابسونو او غوړو د درد د آرامولو لپاره د بوی مادران بوتی ټی ژول (۳). په کاناډا کی د بوی مادران د بوتی څخه د درد د آرامولو او هم د تبی د ورکولو او د خوب لپاره د دی بوتی چای چنسل لپاره گټه اخستل (۱). د بوی مادران د پانی څخه په درملنی کی د وینو درول، د ټپونو جوړول، د غابسونو د درد، د سر د پوخی ورکول، د ویبستیانو د ودی هڅول، د معدی لپاره استعمالیږي.



انځور ۵: د بوی مادران د گلانو رنگونه (<http://www.agri-es.ir/Default.aspx?tabid=4467>)

تاوانونه

بوی مادران د هغو بوتی د ډلی څخه دی چی لږتره تاوانونه لری. د بوی مادران د گلانو مصرف د ایشولو په توگه تاوان نلری، که چیری بوی مادران ډیر مصرف شی، اما دا تاوانونه ورته نسبت ورکړه شوی دی لکه: ډیر لږ واقع کیږی چی بوی مادران د پوستکی حساسیت ډیر کړی، هغه کسان چی د استر (Aster) د کورنی سره حساسیت لری، ماشومانو چی عمرئی تر دو کالو لږ وی، هغه کسان چی موسمی حساسیت لری، بنځینه د امیندواری په وقت، د شیدی ورکونکی به دوره کی د بوی مادران څخه استفاده ونکړی. د حساسیت لرونکو خلکو په سترگو او یا د سترگو شا وخوا ته استعمال نشی. د تاوان په درلودلو خوب لرونکی، بی اشتهایی، کانډی، د روښنای سره حساسیت نښی لری. بوی مادران د ځینو څاروی لکه: سپی، پیشک او آسانو لپاره زهری دی او د ډیری متیازی، کانډی، اسهالی او د پوستکی پرسوب ستونزی پیدا کوی. بالغ کسان د ورځی اضافتر تر ۲۵ گرامه مصرف نکړی. ورځنی د ۴،۵ گرامه استعمال تحریکونکی دی او د تشویش وړ ندی (۴).

پایلی

د بوی مادران بوتهی په کمزورو خاورو په توپیرلرونکو خاورو او اقلیمو کی وده کوی، د دی بوتهی نیلی د تندی سره کلک دی. د بومادران د پانو، گلانو او غورځخه گټه اخستل کیږی. بوتهی د گل په وقت کی زیادترینه گټمن مواد لری، دا پراو د بوی مادران د گلانو او نور غړو (تنه او ځوان بڼاخونه) د ټولولو بڼه وقت بلل کیږی.

بوی مادران خورځوند لری او ځینی وقتونه ترخ وی. د بوی مادران د بوتهی گلان او پانی په چښونکو (نشابه)، درملنی، مصاله او د ترخه خورځولو د خوند د تغیر لپاره استعمالیږی. د دی بوتهی تند او تریخ پانی، بڼاخونه او گلان، د سلاد بوی، خوند، پخلیو، سوپ او ساس ډیروی. د بوی مادران پانی په نورو خوراکو کی د مصالی په توگه، د سرکه او غورځ لپاره استعمالیږی.

منابع

- (1) Alan S. and Weakley, Flora of the Carolinas, Virginia, Georgia and Surrounding Areas. 2008.
- (2) Anonymous: Flora of North America Editorial Committee (ed.). "Achillea millefolium". 2013.
- (3) Anonymous, Native American Ethnobotany, Achillea millefolium University of Michigan-Dearborn. 2013.
- (4) Anonymous: RNZIH-Horticulture pages-Weeds- Achillea millefolium-yarrow. www.rnzih.org.nz. 2015.
- (5) Conti B. et al., Essential oil composition and larvicidal activity of six Mediterranean aromatic plants against the mosquito L. Parasitology Research. 2010; 107(6), pp. 1455–1461.
- (6) Dorling Kindersley Z., encyclopedia of garden plants. United Kingdom. ISBN978-1-4053-3296. 2008, p. 1136.
- (7) Johnson B., Wildflower Center Native Plant Database. Achillea millefolium (Common yarrow). 2013.
- (8) Michler and Carl-Gerold Arnold Predicting Presence of Proazulenes in the Achillea millefolium Group. Barbara, Folia Geobotanica, 1999; Vol. 34, No. 1, pp. 143–161.
- (9) Rouge, B. The PLANTS Database (<http://plants.usda.gov>, National Plant Data Center, USDA, NRCS 70874-4490 USA. 2006.
- (10) Simon & Schuster, Simon & Schuster Guide to Herbs and Spices, Inc. ISBN 978-0-671-73489-3. 1990.