



Investigation of Macroscopic Liver Pathological Changes in Slaughtered Cattle at the Emirati Slaughterhouse of Kabul Province

Mohammad Sangary^{1*}, Ziaullah Hakimi²

^{1,2}Paraclinic Department, Faculty of Veterinary Science, Kabul University, Kabul, Afghanistan

Email: mohammad123sangary@gmail.com

Article History

Received:

June 30, 2026

Accepted:

September 7, 2026

Published:

September 22, 2026

Abstract

The liver is the largest internal organ in the body and is considered a nutritious food because it contains iron, copper, and several vitamins. In Afghanistan, the livers of cattle and other livestock are widely consumed as a palatable food. Due to its strategic anatomical location and diverse physiological functions, the liver is susceptible to various diseases, some of which may also have zoonotic potential. Since no accurate and comprehensive study has been conducted in Afghanistan on pathological changes in the livers of food-producing animals, particularly cattle brought for slaughter, the present study was undertaken. This cross-sectional study examined the livers of 450 cattle brought for slaughter at the Emirati Slaughterhouse in Kabul City during Eid al-Adha in 2024. The findings showed that cysts (6.2%), abscesses (2.2%), and thickening of the bile ducts (4.7%) were the major pathological changes observed in the livers of the examined cattle. Among these pathological changes, cysts—particularly hydatid cysts—are fortunately not usually transmitted to humans through the consumption of infected liver. However, the bacterial agents associated with hepatic abscesses may pose a potential risk of transmission to humans, particularly when proper food hygiene practices are not followed. Overall, the findings indicated that most hepatic pathological changes occurred at relatively low frequencies, while severe and advanced pathological lesions were comparatively uncommon.

Keywords

Liver; Cattle; Pathological changes; Cyst; Slaughterhouse; Kabul

Citation: Sangary, M., & Hakimi, Z. (1405). Investigation of Macroscopic Liver Pathological Changes in Slaughtered Cattle at the Emirati Slaughterhouse of Kabul Province. *Journal of Natural Sciences – Kabul University*, 9(2), 1–15.
<https://doi.org/10.62810/jns.v9i2.592>

د کابل ولایت امارتي مسلخ د ذبح شوو غوایانو په ځیگر کې د میکروسکوپیک پتولوژیکي تغیراتو څېړنه

پوهنمل محمد سنگري^۱، ضیاء الله حکیمي^۲

پاراکلینیک څانګه، د وترنري علومو پوهنځی، کابل پوهنتون، کابل، افغانستان

برېښنالیک: mohammad123sangary@gmail.com

لنډيز

ځيگر د بدن د داخلي غړو په منځ کې تر ټولو لوی غړی دی، چې د اوسپنې، مسو او ځينو ویتامينونو د لرلو له امله مغذي خواړه گټل کېږي. په افغانستان کې د غوایانو او نورو څارویو ځيگر په پراخه توګه د خوندورو خوړو په توګه د هېوادوالو له لوري مصرفېږي. ځيگر د خپل موقعیت او څو اړخیزو دندو له امله د بېلابېلو ناروغيو پر وړاندې حساس دی، چې یو شمېر دغه ناروغۍ ممکن انسانانو ته هم انتقال شي. دا چې په افغانستان کې د خوړو څارویو په ځانګړې توګه د ذبحې لپاره راوستل شوو غوایانو په ځيگر کې د پتولوژیکي بدلونونو اړوند کومه کره او دقیقه څېړنه نه ده ترسره شوې؛ نو پر همدې اساس دا څېړنه په پام کې ونیول شوه. دا مقطعي څېړنه د ۱۴۰۳ هـ ل کال د لوی اختر په ورځو کې د کابل ښار په امارتي مسلخ کې د ذبحې لپاره د راوستل شوو ۴۵۰ غوایانو په ځيګرونو باندې ترسره شوې ده. پایلو وښودله چې کیستونه (۶،۲٪)، آبسې (۲،۲٪) او د صفراوي لارو پېرېدل (۴،۷٪) د یادو غوایانو په ځيګرونو کې مهم پتولوژیک بدلونونه وو. د یادو پتولوژیکي بدلونونو په منځ کې له نېکه مرغه کیستونه معمولاً د ککړ ځيگر د مصرف له لارې انسان ته نه لېږدې؛ خو د آبسو باکتریايي عوامل ممکن په سمه توګه د حفظالصحي د نه مراعاتولو له امله انسان ته ولېږدېږي. د څېړنې پایلو وښودله چې د ځيگر ډېری بدلونونه نسبتاً په ټیټه کچه موجود وو او د شدیدو او پرمختللو پتولوژیکي بدلونونو پېښې لږې وې.

مخينه

د ترلاسه کېدو نېټه:

۶ چنگاښ، ۱۴۰۵

د منلو نېټه:

۱۶ وږی، ۱۴۰۵

د خپرېدو نېټه:

۳۱ وږی، ۱۴۰۵

کلیدي کليمې

ځيگر؛ غوایان؛ پتولوژیک بدلونونه؛ کیستونه؛ آبسې؛ مسلخ؛ کابل

سریزه

الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على سيد المرسلين و على آله و أصحابه أجمعين .

مالداري په هېواد کې په ځانگړې توگه په کليوالي سيمو کې د خوړو چمتو کولو، کاري بوختيا او کورنيو د گټې يا عايد لويه او مهمه سرچينه جوړوي. مالداري د افغانستان د کرنې د ناخالص کورني توليد ۱۵ سلنه چې شاوخوا ۶۸۰ ميليونه امريکايي ډالره کېږي جوړوي او څه باندې يو ميلیون دندې يې رامینځ ته کړي. بوس توروس (*Bos taurus*) چې ډيری وختونه د کورنۍ غوا په نوم هم پېژندل کېږي د شمالي افريقا، اروپا او سويلي آسيا په گډون د نړۍ په ډيری سيمو کې په پراخه توگه ساتل او روزل کېږي (Al-mahmodi & Atyia, 2024). د ملگرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د ۲۰۲۵ کال د راپور پر اساس په افغانستان کې ۵.۵ ميليونه کورنۍ غواوې شتون لري (Our World in Data, 2026) چې د کورنيو له لوري په انفرادي او په فارمونو کې په ډله‌يزه بڼه ساتل کېږي.

کورنۍ غواگانې په عمده ډول د شيدو او غوښې د توليد لپاره روزل کېږي. پوستکي، بېلابېل داخلي غړي لکه: ځيگر، پښتورگي، زړه، ماغزه او نور يې د فرعي محصولاتو په توگه کارول کېږي. ځيگر د بدن د داخلي غړو په منځ کې تر ټولو لوی غړی او د اندوکراین سيستم غده ده چې د زهري موادو د پاکولو، صفرا او پروټينونو توليد، هضم، د کاربوهايډريټ، شحمياتو او پروټين ميتابوليزم، دفاعي سيستم او د هورمونونو د توليد په گډون کي شمېر دندې لري (Valkova et al., 2023; Zachary & McGavin, 2012). ځيگر د اوسپنې، مسو او ویتامين ای (A) او بي (B) د لرلو له امله مغذي خواړه گټل کېږي. په افغانستان کې د غواگانو او نورو څارويو ځيگر په اسانۍ سره له قصاييو څخه د لاسرسي وړ دی او په پراخه توگه د خوندورو خوړو په توگه د هېوادوالو له لوري مصرفېږي (Akter et al., 2022).

ناروغيو، ناامنيو او وچکاليو په تېرو څلورېشت کلونو کې د هېواد د مالدارۍ برخه په خورا بد ډول اغېزمنه کړې ده. ناروغۍ چې په هېواد کې د څارويو د نفوس د اغېزمنېدو يو مهم او اغېزمن لامل بلل کېږي د ويروسي، باکټريايي او پارازيټي عواملو په گډون د بېلابېلو عواملو په وسيله رامنځته کېږي او د بېلابېلو غړو د اخته کېدو په ذريعه په کوچنۍ او لويه کچه د څارويو د مړينې سبب گرځي. يو له دغو غړو څخه چې ډېری وختونه په ناروغۍ اخته کېږي او د پټولوژيکي بدلونونو د رامنځته کېدو پر اساس د انسانانو له مصرف څخه وځي، ځيگر دی. ځيگر د خپل ستراتيژيک موقعيت او څو اړخيزو دندو له امله د بېلابېلو ناروغيو پر وړاندې حساس دی. ځيگر د پارازيټي او نورو ناروغيو له امله زیانمنېږي، چې د

انسانانو له مصرف څخه وځي او هر کال د ځيگر يوه لويه اندازه د مسلخونو څخه بهر کېږي، چې د حيواني پروتين ضايع کېدو او اقتصادي زيان لامل کېږي (Akter et al., 2022).

څېړنو څرگنده کړې ده، چې په ځيگر کې د بېلابېلو ناروغيو کچه د ساحې جغرافيايي جوړښت، اقليم او د څړځايونو کارونې او نورو عواملو پورې تړاو لري. له همدې امله په هر هېواد او حتی د يو هېواد په بېلابېلو برخو کې په ساتل کېدونکو څارويو لکه غوا، وزو او مېږو کې بايد ورته څېړنې ترسره شي، خو د هغې پر اساس شته ناروغيو ته د کنټرول او مخنيوي پروگرامونه جوړ او پلي شي. دا چې تر اوسه په افغانستان کې د خوړو څارويو په ځانگړې توگه د ذبحې لپاره راوستل شوو غواگانو په ځيگر کې د ناروغيو يا پتولوژيکي بدلونونو د شتون، سلنې او ډولونو په هکله کومه کره او دقيقه څېړنه نه ده ترسره شوې، پر همدې اساس دا څېړنه په پام کې ونيول شوه. د دې څېړنې پايلې به ياد مسلخ ته د راوړل کېدونکو غواگانو په ځيگر کې د میکروسکوپيکو کتنو پر اساس د رامنځته شوو پتولوژيکي بدلونونو سلنه او د هغې پر اساس به د اړونده نارغيو اټکليزه شيعو څرگنده کړي. دا کار به اړونده مسوولينو او په ساحه کې فعالو وترنر ډاکترانو ته د يادو ناروغيو په هکله د قصابانو او هېوادوالو د عامه پوهاوي د لوړاوي په برخه کې به د لا زيات تمرکز او اغېزمنتيا سبب شي. پر دې سربېره د يادې څېړنې د پايلو پر بنسټ کېدای شي په ساحه کې د يادو ناروغيو د مخنيوي او درملنې اړوند د مالدارانو د عامه پوهاوي کچې د لوړوالي او د ناروغيو د مخنيوي او کنټرول لپاره په امارتي کچه مهم پلانونه جوړ او پلي شي.

تېرو آثارو ته کتنه

څېړنو ښودلې ده، چې د ځيگر بالغ چينجي، د ځيگر التهاب، نری رنځ (توبرکلوز)، هيداتيدوز، سيستيسرکوز، د ځيگر دانې (آبسي)، د صفراوي لارو پېږېدنه (غټوالي)، شحمي بدلونونه، وينه بهېدنه، د کلسيم رسوب، نکروز، فبروز او سيروز د ځيگر تر ټولو عامې ناروغۍ دي، چې د ذبح شوو څارويو په ځيگر کې موندل کېږي (Akter et al., 2022; Al-Mahmood et al., 2017; Ghalandarzadeh & Amniattalab, 2019; Mimoune et al., 2022; Mohamed, 2021). د پورته ذکر شوو ناروغيو او پتولوژيکي حالتونو کې يو شمېر يې يوازې څاروي اخته کوي او په څارويو کې د مړينې او ځيگر د ضايعاتو لامل کېږي، خو يو شمېر نور يې چې زونوز (Zoonosis) بڼه لري کولای شي انسانانو ته ولېږدېږي (Mohamed, 2021). د يادو پتولوژيکي بدلونونو په منځ کې د آبسو او نورو پتولوژيکي بدلونونو باکتريايي عوامل په ځانگړې توگه د نري رنځ ناروغي د نورو عواملو په پرتله زيات عامې روغتيا ته گواښ پېښوي. يادې ناروغي معمولاً د ځيگر په کتلو، لمس کولو او پرې کولو سره پېژندل کېږي. د يادې موضوع اړوند په

ګاونډیو او د سیمې په کچه نورو هېوادونو کې بېلابېلې څېړنې ترسره شوي، چې تر ټولو زیاتې اړوندې یې په لاندې ډول ذکر کېږي.

هغه څېړنه چې په نایجریا کې د ذبح شوو غوایانو په ځیګرونو باندې ترسره شوې څرګندوي، چې د ټولو (۲۸۶) معاینه شوو ځیګرونو له ډلې څخه ۲۳،۳۱٪ یې پتولوژیک بدلونونه درلودل چې د ځیګر غټېدنه، پرخوني، وینه بهېدنه، نکروز او فبروز د یادو بدلونونو عمده ډولونه وو (Adam et al., 2022). بله څېړنه چې په ۲۰۲۲ کال په بنګله دېش هېواد کې د غوایانو او وزو په ځیګرونو ترسره شوې څرګندوي چې د ځیګر عمده پتولوژیک بدلونونه د ځیګر چینجي له وجې رامنځته شوي (Akter et al., 2022). هغه څېړنه چې د ال محمود او ملګرو له لوري یې په ۲۰۱۷ کال په عراق کې ترسره شوې څرګندوي، چې له ټولو (۶۲۱۱) پلټل شوو ځیګرونو څخه ۱۱،۸۸٪ یې په پتولوژیکي بدلونونو اخته وو، چې د ځیګر چینجي (۳،۳۴٪)، هیداتید کیست (۳،۱۲٪)، د ځیګر آبسې (۲،۲۹٪)، د ځیګر او صفراوي کڅوړې التهاب (۲،۰۱٪)، او د ځیګر وینه بهېدنه او پرخوني (۱،۰۳٪) یې په ترتیب سره مهم تغیرات وو (Al-Mahmood et al., 2017). هغه څېړنه چې په سوډان کې د محمد له لوري د ذبح شوو غوایانو په ځیګرونو ترسره شوې ښیي، چې له ټولو (۲۳۴۱۷۵) ځیګرونو څخه ۳،۸٪ یې غیرنورمال وو چې د ځیګر چینجي، سیستیسرکوز، نکروز او آبسې یې څلور مهم پتولوژیک حالتونه وو (Mohamed, 2021). هغه څېړنه چې د ایران د زابل ښار په مسلخ کې ترسره شوې ښیي چې له ټولو (۲۸۱) ځیګرونو څخه ۳۲،۰۲٪ یې مکروسکوپیک پتولوژیک بدلونونه درلودل چې هیداتیدوز، د ځیګر چینجي، د ځیګر التهاب او شحمي تغیرات یې تر ټولو مهم پتولوژیک بدلونونه وه (Sanjari et al., 2018). هغه څېړنه چې ابراهیمي او ملګرو یې د خوست ښار په وزو باندې د ځیګر چینجي د ناروغۍ په هکله په ۲۰۲۳ کال کې ترسره شوې، وښودله چې له ټولو (۱۰۰) نمونو څخه ۳۸٪ یې د ځیګر چینجي په ناروغۍ اخته وې (Ibrahimi et al., 2024).

د څېړنې مواد او کړنلاره

د څېړنې سیمه

دا څېړنه د کابل ښار د مکروریانو څلور لارې ته څېرمه په نهمه ناحیه کې د غوښې او لبنیاتو د چمتو کولو د اماراتي شرکت اړوند په مسلخ کې ترسره شوې ده. کابل ښار چې د هېواد یو له ګڼ مېشتو ښارونو څخه دی د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د معلوماتو پر اساس څه باندې ۵ میلیونه نفوس لري، چې د هېواد ټول نفوس شاخوا ۷مه برخه جوړوي (NSIA, 2025). د کابل ښار د غوښې لویه برخه د هغو

څارويو له لوري چمتو کېږي چې د هېواد په نورو ولايتونو کې روزل کېږي او د خرڅلاو لپاره د کابل ولايت ته راول کېږي. ياد مسلخ ته هره ورځ په لس گونه او سل گونه څاروي لکه: غويان، مېښې او پسونه راوړل کېږي؛ څو هېوادوالو ته باکيفيته غوښه چمتو کړي.

د نمونې اندازه

د نمونې اندازه د معياري نمونې د اندازه کولو فورمول په کارولو سره د يوې مقطعي مطالعې لپاره حساب شوه. د ۹۵٪ باور کچې، د ۵٪ خطا او د خپرېدو د ۵۰٪ فرض شوي کچې په پام کې نيولو سره (ځکه په پخوانيو خپرو شوو منابعو کې د يادې موضوع د شيوخ او خپراوي اړوند معلومات شتون نه لري)، د نمونې لږترلږه اړينه اندازه محاسبه شوه. د مطالعې د دقت ښه کولو، احتمالي نيمگړو ريكارډونو د لرې کولو او د احصايوي دقت د زياتولو لپاره د نمونې اندازه ۴۵۰ ته لوړه شوه. له همدې امله، په ټوليزه توگه په مطالعه کې ۴۵۰ څاروي شامل او وڅېړل شول.

د ارقامو راټولول

په لومړي سر کې د ارقامو د راټولولو لپاره د بېلابېلو مأخذونو په کارولو سره يو فورم جوړ شو. په دې فورم کې د د ځيگر د مشخصاتو اړوند بېلابېلې پوښتنې لکه د ځيگر رنگ، اندازه، کلکوالی او نرموالی او د بېلابېلو ناروغيو ټولوژيک بدلونونه لکه د دانو (آبسو) شتون، د ځيگر د چينجيو شتون، د کيستونو شتون او نور ځای پر ځای شوي وو. دا څېړنه د ۱۴۰۳ هجري لمريز کال د لوی اختر په ورځو کې د غوښې او لبنياتو د چمتو کولو د اماراتي شرکت په مسلخ کې ترسره شوه. د څېړنې پر مهال لومړی مسلخ ته د راوستل شوي څاروي ظاهري ښه او ځانگړتيا لکه عمر، جنس، نسل، بدني وضعيت، د ژامې لاندې او د خېټې پرسوب ارزول او ثبت کېدل. له هغې وروسته کله به چې ياد څاروی ذبح او داخلي اعضا به يې راوويستل شول د څاروي ځيگر به په هر اړخيزه توگه د مسلخ د مسوول ډاکټر په همکارۍ ارزول کېده.

تجزيه او تحليل

راټول شوي معلومات لومړی مايکروسافټ ايکسل (Excel) ته داخل او وروسته د احصايوي تحليل لپاره د IBM SPSS احصايوي نسخې (۲۵ ورژن) ته ولېږدول شول. د تشریحي احصايې برخې د فريکونسي، سلنې او اوسط په کارولو سره وښودل شوې

موندنې

عمومي معلومات

په دې څېړنه کې په ټوليز ډول شاوخوا ۴۵۰ څاروي شامل وو، چې له ذبح کولو وروسته يې ځيگرونه د بېلابېلو ناروغيو اړوند پټولوژيکي بدلونونو د موندلو لپاره د وترنر ډاکټر له لوري وکتل شول. مسلخ ته راوړل شوو څارويو بېلابېل عمرونه درلودل چې اوسط يې ۲،۰۱ کاله وه (لږ عمر ۲ او تر ټولو زيات عمر ۵ کاله وه). کله چې په څېړنه کې شامل ټول څاروي د عمر په لحاظ په درې ډلو ووېشل شول (له يو کلن کم عمر لرونکي، د دوو او دريو کالونو تر منځ او څلور کلن يا له هغې پورته) وليدل شول چې له يو کلن ښکته هيڅ څاروی په څېړنه کې نشته، ۴۴۹ څارويو د دوو او دريو کالونو تر منځ عمر درلود او يوازې يو څاروي پينځه کاله عمر درلود. د ټولو ذبح شوو څارويو له ډلې څخه ۶۰٪ يې ښځينه (غواگانې) او ۴۰٪ يې نارينه (غوايان) وو. د نسل پر اساس د ذبح شوو څارويو ۵۸٪ يې دوړگه څاروي او پاتې ۴۲٪ يې وطني نسلونه وو. څېړنې په ډاگه کړه چې مسلخ ته راوړل شوي ۳۷٪ څاروي د بدني وضعيت له اړخه ډنگر ول په داسې حال کې چې پاتې ۶۳٪ نور يې متوسط او ښه ول. په څېړنه کې د ټولو څارويو له ډلې څخه ۸٪ څارويو د ژامې لاندې پړسوب درلود، ۳۳٪ څارويو په نس کې په غيرنورمال توگه له اندازې زياتې اوبه درلودې. په (۱ انځور) کې په څېړنه کې د شاملو څارويو د جنسيت، نسل، بدني وضعيت او د ژامې لاندې پړسوب اړوند عمومي معلومات وړاندې شوي دي.



۱ انځور: له ذبح کولو وړاندې د حيوان ځانگړتياوې د سلني پر اساس


د ځيگر مکر و سکوپيک بدلونونه

د ټولو معاینه شوو ځيگرونو له ډلې څخه یوازې په یوه ځيگر کې په لږه اندازه شحمي بدلونونه وليدل شول. په همدې ډول د معاینه شوو ځيگرونو له ډلې څخه په ۱۰ دانو (۲،۲٪) کې يې آبسې وليدل شوې. د عمر په پام کې نيولو سره د ځيگر د آبسو ټولې لس واړه پېښې په هغو غوايانو کې وليد شوې، چې د ۲ او ۳ کالونو ترمنځ عمر يې درلود. د جنسیت او نسل په لحاظ د ځيگر د آبسو پېښې د نارینه او ښځينه جنس او د دورگه او وطني نسلونو ترمنځ مساوي وې. د بدني وضعیت په پام کې نيولو سره څرگنده شوه چې د ځيگر د آبسو له ټولو پېښو څخه ۳ يې په ډنگرو او پاتې ۷ يې په متوسط بدني وضعیت لرونکو څارويو کې رامنځ ته شوې وې. په هر اغېزمن شوي ځيگر کې د آبسو شمېر په اوسط ډول ۹،۴ دانو ته رسېده چې د حد اقل اندازه ۱ او د حد اکثر اندازه يې ۲۷ دانې وې. د اندازې له مخې له هرو لسو آبسو څخه د نهو قطر يې ۱ سانتې متر او يا له هغې څخه کم وو او یوازې د يوې آبسې قطر له ۲ سانتې متر څخه زیات وو.

د معاینه شوو ځيگرونو په هيڅ يوه نمونه کې د ځيگر چينحي و نه ليدل شول. د ټولو ۴۵۰ معاینه شوو ځيگرونو له ډلې څخه په ۲۸ دانو (۶،۲٪) کې يې کيستونه وليدل شول. د نسل په پام کې نيولو سره ۶۷،۸٪ کيستونه په دورگه او پاتې ۳۲،۲٪ کيستونه په محلي نسلولو کې و موندل شول. د جنس په پام کې نيولو سره څرگنده شوه چې ۵۷٪ کيستونه په نارینه او پاتې ۴۳٪ په ښځينه څارويو کې موجود وو. د ځيگر په کيست اخته ۲۱٪ څاروي د بدني وضعیت په لحاظ ډنگر وو. په هر ځيگر کې په اوسط ډول د کيستو شمېر ۷،۲۸ دانو ته رسېده. د څېړنې پرمهال، په هيڅ کوم ځيگر کې د فيروز پېښه و نه ليدل شوه. د معاینه شوو ځيگرونو له جملې څخه په ۲۱ دانو (۴،۷٪) ځيگرونو کې د صفراوي مجراوو پېرېدل وليدل شول. د ځيگر د مکر و سکوپيک بدلونونو ارزونې وښودله چې د معاینه شوو ځيگرونو له ډلې څخه ۵،۶٪ يې د نورمال حالت په پرتله يو څخه کم رنگه وو. له دې جملې څخه ۴،۷٪ ځيگرونو منشره يا خپره او ۰،۹٪ موضعي کم رنگي درلوده.

همدارنگه د ټولو معاینه شوو ځيگرونو له ډلې څخه ۶ دانو (۱،۳٪) کې يې پرخوني وليدل شوه. د معاینې پر مهال په هيڅ کوم ځيگر کې وینه بهېدنه و نه ليدل شوه. د معاینه شوو ځيگرونو له ډلې څخه ۳،۱٪ يې د نورمالې اندازې په پرتله لوی شوي وو. په همدې ډول ۷،۱٪ ځيگرونه د نورمال حالت په پرتله کلک شوي وو. د لمس کولو په وسيله تر معاینې وروسته څرگنده شوه چې ۱،۳٪ ځيگرونو ماتېدونکي غيرنورمال حالت درلود يعنې ځيگر په اسانۍ سره ټوټه کېده. په پای کې د معاینه شوو

ځيگرونو کې په هيڅ نمونه کې د تومور اړوند کلکه کتله ونه ليدل شوه. د ځيگر د مکروسکوپيکو بدلونو عمومي سلنه په (۲ انځور) کې ښودل شوې ده.



۲ انځور: د ځيگر بېلابېل پتولوژيکي حالتونه د نورمالو حالتونو په پرتله



۳ انځور: په پورته انځور کې (ښي لوري ته) د وکتور په وسیله د صفراوي لارو هايپرپلازیا او پراخېدنه او (کيڼ لوري ته) د ځيگر د پاسه د زیات شمېر آبسو شتون ښودل شوی دی. نوټ: د ۳۴۵ او ۳۱۰ عددونه د اړونده فورمونو مسلسلې شمېرې دي

مناقشه

د دې څېړنې موندنې ښيي چې د ارزول شوو ځيگرونو له ډلې څخه ۲،۲٪ يې په آبسو اخته وو؛ په داسې حال کې چې د علي زاده او امنيت طلب څېړنه چې د ايران په اروميه ښار کې يې د غوايانو په ۱۲۸۶ ځيگرونو ترسره کړې په ځيگر کې د آبسو ۶،۴٪ شتون راپور ورکړی دی. په اروميه ښار کې د

ترسره شوې څېړنې پایلې د ۳ برابره زیاتو آبسو شتون څرگندوي چې دا زیاتوالی له یو اړخه د ساحې په جغرافیایي جوړښت او په ساحه کې د ځینو نباتاتو په شتون پورې تړاو لري او له بله اړخه په ځیگر کې د آبسو شتون د څاروي په عمر پورې هم تړاو لري؛ یعنې هرڅومره چې د یو څاروي عمر زیات وي په هماغه اندازه د هغه څاروي په ځیگر کې د آبسو د شتون یو احتمالي عامل بلل کېږي؛ چې په دې صورت کې د ځیگر چینجی هم په ځیگر کې د آبسو د شتون یو احتمالي عامل بلل شوی دی (علی زاده او امنیت طلب، ۱۳۹۷). د باکتریایي عواملو له ډلې څخه فوزوباکتریوم نکروفوروم (*Fusobacterium necrophorum*) د ځیگر د آبسو عمده لامل ګڼل کېږي. د دې ترڅنګ تروپیریل پېوجن (*Trueperella pyogenes*)، سترپتوکوک، ستافیلوکوک او نورې باکتریاوې هم له آبسو څخه د اخیستل شوو نمونو په پایله کې تجرید شوي دي (Foreman, 2024). له بله اړخه هغه څاروي چې په آزاده توګه په څړځایونو کې څري د هغو څارویو په پرتله چې په لاسي توګه تغذیه کېږي د ځیگر چینجی له وسطي/منځني کوربه (میزبان) سره د مخ کېدو احتمال ډېر دی چې دا هم د مساعدونکو عوامل څخه ګڼل کېږي (علی زاده او امنیت طلب، ۱۳۹۷). بله څېړنه چې د تاجیک او همکارانو له لوري د ایران د شیراز ښار په مسلخ کې په ۴۳۵ غوایانو ترسره شوې د ټولو پلټل شوو ځیګرونو له ډلې څخه ۲۸ دانو (۶،۴۴) یې آبسې درلودې؛ چې د دې څېړنې پایلې هم زموږ د څېړنې له پایلو سره مطابقت نه لري (تاجیک او ملګري ۱۳۹۲). هغه څېړنه چې د ال محمود او ملګرو لخوا یې په ۲۰۱۷ کال د عراق په یو ښار کې ترسره شوې د ذبح شوو غواګانو په ځیګر کې د آبسو ۲،۲۹٪ پېښو شتون راپور کړی چې یادې پایلې زموږ له موندنو سره یوشانوالی لري او هغه تاییدوي (Al-Mahmood et al., 2017).

د دې څېړنې په پایله کې د ځیګر چینجی کومه پېښه و نه موندل شوه. په داسې حال کې چې د علي زاده او امنیت طلب د څېړنې په پایلو کې د ځیګر چینجی د پېښو کچه ۲۵،۵٪ ته رسېده. هغه څېړنه چې د ابراهیمي او ملګرو له لوري یې د خوست ښار په ۱۰۰ وزو کې ترسره شوې ده د ځیګر چینجی د شتون کچه ۳۸٪ ښودل شوې. چې د دواړو څېړنو پایلې زموږ له موندنو سره همغږي نه لري. دا چې زموږ په څېړنه کې د ځیګر چینجی کومه مثبته پېښه نه ده موندل شوې کېدای شي بېلابېل عوامل ولري؛ خو زموږ په آند عمده لامل به یې دا وي چې په دې څېړنه کې نسبت نورو ورته ترسره شوو څېړنو ته د نمونې اندازه کوچنۍ وه او بل دا چې یاده څېړنه په یوه ډېره لنډه موده چې درې ورځې کېږي یوازې په غوایانو کې ترسره شوې ده. په دې څېړنه کې د ځیګر چینجی نشتون په دې معنی نده چې په هېواد کې د څارویو د ځیګر چینجی پېښې نشته، بلکې دا موضوع په ځینو نورو فکتورونو پورې هم تړاو لري چې

د هغو له جملې څخه یوه داده چې ذبح شوي څاروي د هېواد له کومو برخو څخه راوړل شوي وو او د هغوی د روزنې طریقه څه ډول وه. دا چې ذبح شوي څاروي له دویم او درېیم لاس پلور وروسته مسلخ ته رارسېږي؛ نو پر دې اساس د څارویو د روزنې ساحې او د روزنې د طریقې (لاسي یا څړځای) اړوند کره معلوماتو ته لاسرسی ستونزمن او ناشونی وو. په دې څېړنه کې د ځیگر اړوند پتولوژیک بدلونونه یوازې د ظاهري بڼې په کتلو سره ثبتېدل یعنې د ځیگر دنننیو بدلونو لپاره ځیگر نه ټوټه کېده؛ په داسې حال کې چې په نورو څېړنو کې د چینجیو د ارزونې لپاره ځیگر ټوټه کېده او د هغې اړوند پارازیتولوژیک معاینات ترسره کېدل.

په همدې ډول، د دې څېړنې په پایله کې څرگنده شوه چې د کتل شوو نمونو په منځ کې یوازې ۶،۲ سلنه ځیگرونو هیداتید کیست درلود. بلخوا هغه څېړنه چې علي‌زاده او امنیت طلب لخوا په ۱۳۹۷ کال په ایران کې ترسره شوې په ځیگر کې د هیداتید کیست د خپرېدو کچه ۱۰،۹٪ راپور کړې چې پایلې یې زموږ له موندنو سره توپیر لري (علي‌زاده او امنیت طلب، ۱۳۹۷). زموږ او د علي‌زاده او امنیت طلب د څېړنو د پایلو ترمنځ د توپیر یو مهم لامل کېدای شي په څېړنه کې د شاملو څارویو په عمر پورې تړاو ولري، ځکه د علي‌زاده او امنیت طلب په څېړنه کې د لوړ عمر څاروي زیات شامل وو او د هغوی د پایلو پر اساس د هیداتید کیست زیاتې پېښې هم په همدې څارویو کې راپور شوې وې. هغه څېړنه چې د ال‌محمود او ملگرو له لوري یې ترسره شوې د هیداتید کیست پېښې ۳،۱۲٪ ښودلې دي، چې زموږ د موندنو په پرتله نیم کموالی ښيي (Al-Mahmood et al., 2017).

په کابل کې زموږ د ترسره شوې څېړنې پایلې څرگندوي، چې په ۱،۳٪ ځیگرونو کې پرخوني یا د وینې زیاتوالی موجود و. هغه څېړنه چې د ال‌محمود او ملگرو لخوا یې ترسره شوې په ځیگر کې د پرخوني د ۱،۰۳٪ پېښو راپور ورکړی (Al-Mahmood et al., 2017). د ال‌محمود او زموږ د څېړنو پایلې سره نږدې دي او مطابقت لري. د ځیگر پرخوني د بېلابېلو پتولوژیکي او فزیولوژیکي عواملو په ترڅ کې رامنځ ته کېدای شي. تر ټولو مهم لاملونه یې د زړه د ښې اړخ بېوسي، له وریدونو څخه د وینې د وتلو پر وړاندې خنډ، مزمنې تنفسي ناروغۍ او ځینې زهري یا عفوني حالتونه دي. یاد حالتونه په ټولیز ډول له ځیگر څخه د وینې د وتلو بهیر ګډوډوي چې په دې توګه په ځیگر کې د وینې د راټولېدو سبب ګرځي. سربېره پر دې، د ذبح کولو پر مهال پر حیوان فشار او په سمه توګه له بدن څخه د وینې نه وتل هم د ځیگر د پرخونۍ لامل کېدای شي. له همدې امله په څېړنو کې د ځیگر پرخوني تل د یوې ناروغۍ ښه نه ګڼل کېږي، بلکې د کلینیکي، اپیدمیولوژیکي او نورو موندنو په رڼا کې باید په پوره احتیاط سره تفسیر شي.

په دې څېړنه کې له ۴۵۰ کتل شوو ځيگرونو څخه ۲۱ ځيگرونه چې د ټولو ځيگرونو شاوخوا ۴,۷٪ جوړوي د صفراوي لارو په هايپرپلازيا اخته وو، چې په دې حالت کې د صفراوي لارو دېوالونه پېرېږي. هغه څېړنه چې د علي زاده او امنيت طلب له لوري ترسره شوې په هغې کې د صفراوي لارو هايپرپلازيا ۲۴,۵٪ ښودل شوې ده، چې يادې پايلې زموږ له موندنو سره خورا لوی توپير لري (علي زاده او امنيت طلب، ۱۳۹۷). د صفراوي لارو د هايپرپلازيا يو مهم لامل د ځيگر چينجي ښودل شوی (Javaregowda & Rani, 2017) په داسې حال کې چې زموږ په څېړنه کې د ځيگر چينجي کومه مثبته پېښه نه ده موندل شوې. ياده موضوع د ځيگر چينجي د نه شتون لپاره زموږ هاغه حدس او احتمالي دليل لاقوي کوي چې د يادو چينجيو نه شتون مو د ځيگر نه پرې کول او د دنننيو برخو د کتلو نه شونتيا ښودلې وه.

پايلې

د غواوو د ۴۵۰ معاينه شوو ځيگرونو د مکروسکوپيکي ارزونو پايلو وښودله چې د ځيگر ډېری بدلونونه نسبتاً په ټيټه کچه موجود وو او د شديدو او پرمختللو ټولوژيکي بدلونونو پېښې لږ وې. د ټولوژيکي بدلونونو له ډلې څخه کيستونه (۶,۲٪) تر ټولو ډېر ليدل شوی بدلون و، په داسې حال کې چې د ځيگر آبسو کچه ۲,۲٪ ته رسېده. د پورته موندنو پر خلاف، د ځيگر چينجي، فبروز، وينه بهېدنې او توموري کتلو هيڅ پېښه و نه موندل شوه. همدارنگه د صفراوي لارو پېرېدل، ځيگر کمړنگي، پرخوني او د ځيگر ماتېدونکي قوام هغه غيرنورمال حالتونه دي چې په ټيټه کچه يې شتون درلود. د يادو ټولوژيکي بدلونو په منځ کې له نېکه مرغه کيستونه معمولاً د ککړ ځيگر د مصرف له لارې انسان ته نه لېږدې، مگر د آبسو باکټريايي عوامل ممکن په سمه توگه د حفظ الصحتې د نه مراعاتولو له امله انسان ته ولېږدېږي. په ټوليز ډول د څېړنې موندنې څرگندوي چې د ذبح شوو غواوو په ځيگرونو کې ټولوژيک بدلونونه د نورو څېړنو په پرتله کم و. ترسره شوې څېړنه په ټوليز ډول په مکروسکوپيکو معايناتو هغه چې د سترگو په وسيله د ليدلو او تشخيص وړ وو ولاړه وه. د امکاناتو د نه شتون له امله موږ و نشو کولای چې د هستوټولوژي او نورو آزمايښتوني آزمېښتونو لپاره نمونه واخلو. د څېړنې پر مهال د ځيگر معاينه د ځيگر له پرې کولو پرته ترسره کېده، په داسې حال کې چې د ځيگر پرې کول او هغه د دنننۍ برخې معاينه د ځيگر چينجي د شتون لپاره اړينه بلل کېږي.

مننه او کورودانۍ

موږ د غوښې او لبنياتو د چمتو کولو د امارتي شرکت له مسولينو او موظف وترنر ډاکټر څخه مننه کوو چې د دې څېړنې په ترسره کولو او د ډېټا په راټولو کې يې له موږ سره مرسته کړې.

د لیکوالانو ونډه

محمد سنگري د څېړنې عنوان او طرحه چمتو کړې او ضياء الله حکيمي له ساحې څخه ډېټا راټوله کړې. د ډېټا تجزيه او تحليل د دواړو لیکوالانو په همکارۍ ترسره شوې. محمد سنگري مقاله لیکلې او ضياء الله هاشمي مرور او اصلاح کړې.

د گټو ټکر

دواړه لیکوالان تصدیق کوي، چې د څېړنې په ترسره کولو او د مقالې د امتیاز په اخیستو کې د دوی ترمنځ د گټو کوم ټکر نشته.

اخځلیکونه

- تاجیک، ج.؛ درخشنده، ع.؛ رستمی، ع.؛ و خواجویی، ل. (۱۳۹۲). بررسی میزان شیوع و برخی عوامل مرتبط با آبه‌های کبدی در گاوهای کشتار شده در کشتارگاه شیراز. *تحقیقات دامپزشکی و فرآورده‌های بیولوژیک*، ۲۶ (۴)، ۵۵-۵۹. <https://doi.org/10.22092/vj.2013.101016>
- علی‌زاده؛ ر.؛ و امنیت‌طلب، ا. (۱۳۹۷). بررسی آسیب‌شناسی کبدهای ضبط شده گاوهای کشتاری در کشتارگاه ارومیه. *مجله پژوهش‌های بالینی دامپزشکی*، ۹ (۲)، ۱۲۱-۱۳۴ لینک
- Adam, M., Bakare, R. A., Ola-Fadunsin, S. D., Akanbi, O. B., Kigir, E. S., & Barka, S. A. (2022). Pathological Changes of Fasciola Species Infection in Cattle Slaughtered in Ilorin Abattoir Kwara State , Nigeria. *Journal of Veterinary Medicine*, 16(4), 356–363. <https://doi.org/10.22059/IJVM.2022.342551.1005270>
- Akter, L., Pal, D. C., Sultana, N., Pervin, M., Siddiqi, M. N. H., & Karim, M. R. (2022). Anatomic pathology of cattle and goat liver collected from slaughterhouses in Mymensingh city of Bangladesh. *Journal of Agriculture, Food and Environment*, 3(2), 50–56. <https://doi.org/10.47440/JAFE.2022.3210>
- Al-mahmodi, A. M., & Atyia, M. A. (2024). Anatomical , Radiological , and Corrosion Casting of the Liver , Gallbladder , and Biliary Duct System of Local Breed Cattle (Bos ttaurus). *Wasit Journal for Pure Science*, 3(1), 116–127. <https://doi.org/10.31185/wjps.290>
- Al-Mahmood, S. ., Farhan, A. ., Daoud, Z. ., & Hamed, O. . (2017). Pathological study of liver lesions in cattle slaughtered at Kirkuk province abattoir. *Iraqi Journal of Veterinary Sciences*, 31(1), 7–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.33899/ijvs.2017.126713>
- Our World in Data. (2026). *Number of Cattle*. Our World in Data. <https://ourworldindata.org/grapher/cattle-livestock-count-heads?tab>
- Foreman, J. H. (2024). *Liver Abscesses in Cattle*. MSD Manual. [link](#)
- Ghalandarzadeh, B., & Amniattalab, A. (2019). Prevalence and pathological evaluation of hepatic fatty change in cattle slaughtered at Urmia abattoir , northwest Iran. *Iraqi Journal of Veterinary Sciences*, 33(1), 45–50. <https://doi.org/10.33899/ijvs.2019.125518.1040>
- Ibrahimi, M., Khalid, B., & Mirafzal, A. (2024). An Investigation of the Prevalence's of Fascioliasis in Goats in the Central Areas of Khost Province Afghanistan. *International Journal of Applied and Scientific Research (IJASR)*, 2(2), 177–186. <https://doi.org/10.59890/ijasr.v2i2.1303>
- Javaregowda, A. K., & Rani, K. B. (2017). Chronic bovine fasciolosis associated cholangiolithiasis : a case report. *Journal of Parasitic Diseases*, 41(1), 90–92. <https://doi.org/10.1007/s12639-016-0755-8>
- Mimoune, N., Hamiroune, M., Boukhechem, S., Mecherouk, C., Harhoura, K., Khelef, D., & Kaidi, R. (2022). veterinary sciences Pathological Findings in Cattle

- Slaughtered in Northeastern Algeria and Associated Risk Factors. *Vet. Sci*, 9(7), 1–14. <https://doi.org/10.3390/vetsci9070330>
- Mohamed, K. A. D. (2021). A study on causes of cattle liver condemnation at an abattoir in Omdurman area , Khartoum State , Sudan. *BMC Veterinary Research*, 17(1), 1–6. <https://doi.org/10.1186/s12917-021-02766-4>
- NSIA. (2025). *Estimated Population of Afghanistan in 2025-26*. [link](#)
- Sanjari, A., Davari, S. ., & Rasekh, M. (2018). Macroscopic and histopathological examinations of liver lesions in slaughtered cattle in Zabol City , Iran Abstract : *Iranian Journal of Veterinary Medicine*, 12(2), 135–143. <https://doi.org/10.22059/ijvm.2018.248683.1004869>
- Valkova, L., Voslarova, E., Nincakova, S., Passantino, A., & Vecerek, V. (2023). The Incidence of Liver Damage Found during Postmortem Examination at the Slaughterhouse. *Animals*, 13(5), 1–13. <https://doi.org/10.3390/ani13050839>
- Zachary, J. F., & McGavin, M. D. (2012). *Pathologic basis of veterinary disease* (5th ed.). Elsevier.